

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ODONTOIATRIA PEDIATRICA

A.A. 2024 / 2025

Compito C

- 1) La seconda chiave di Andrews valuta
 - a) Relazioni interarcata
 - b) Angolazione delle corone**
 - c) Inclinazione delle corone
 - d) Punti di contatto dei denti
- 2) Quale tra le seguenti non è una anomalia dentaria di volume?
 - a) Microdontia
 - b) Macrodontia
 - c) Oligodontia**
 - d) Taurodontismo
- 3) L'affollamento dentario si può riscontrare:
 - a) **Dentizione decidua, mista, permanente**
 - b) Solo dentizione decidua
 - c) Solo dentizione mista
 - d) Solo dentizione permanente
- 4) L'ipolasia dello smalto:
 - a) è una patologia sempre di origine genetica
 - b) è un difetto di tipo qualitativo
 - c) è una mancata formazione della matrice dello smalto**
 - d) è un difetto di mineralizzazione
- 5) La camera pulpare dei molari è:
 - a) più grande nei denti decidui**
 - b) più piccola nei molari decidui
 - c) meno vascolarizzata nei denti decidui
 - d) Non c'è differenza
- 6) Di norma, la dentizione decidua:
 - a) si completa a 20 mesi con l'eruzione dei canini inferiori
 - b) si completa a 30 mesi con l'eruzione dei secondi molaretti decidui**
 - c) si completa 20 mesi con l'eruzione dei canini superiori
 - d) si completa a 20 mesi con l'eruzione dei primi molaretti
- 7) La sequenza più comune dei denti coinvolti nella Early Childhood Caries è:
 - a) Molari mandibolari → molari mascellari → incisivi mascellari
 - b) Incisivi mascellari → molari mascellari → molari mandibolari**
 - c) Molari mandibolari → incisivi mascellari → molari mascellari
 - d) Canini mascellari → incisivi mandibolari → molari mandibolari
- 8) La persistenza della deglutizione infantile può determinare:
 - a) competenza labiale
 - b) contrazione dei diametri trasversi dei mascellari**
 - c) morso profondo
 - d) retrusione degli incisivi superiori
- 9) Un bambino che ha in arcata 12 denti decidui e 12 denti permanenti, quanti anni ha?
 - a) 3 anni
 - b) 8,5 anni**
 - c) 13 anni
 - d) 18 anni
- 10) La vernice al fluoro con 22600 ppm di Fluoro per la fluoroprofilassi topica viene applicata:
 - a) ogni 15 giorni
 - b) ogni 3 mesi**
 - c) una volta l'anno
 - d) ogni 3 anni

- 11) Il paziente respiratore orale presenta:
- a) **arcata superiore stretta**
 - b) arcata superiore larga
 - c) overjet diminuito
 - d) mucose orali idratate
- 12) L'elemento dentario indicato con il numero 6.5 è:
- a) Incisivo centrale deciduo superiore sinistro
 - b) Primo molare deciduo superiore destro
 - c) **Secondo molare deciduo superiore sinistro**
 - d) Canino deciduo superiore sinistro
- 13) Quale è il primo elemento dentario che viene colpito dall'Early Childhood Caries?
- a) Primo molare superiore permanente
 - b) Primo molare superiore deciduo
 - c) **Incisivo centrale superiore deciduo**
 - d) Secondo premolare superiore permanente
- 14) I traumi nei denti decidui:
- a) **sono più frequenti in età scolare**
 - b) non sono mai considerati condizioni d'urgenza
 - c) non necessitano mai di indagini radiografiche
 - d) non determinano conseguenze sui denti permanenti
- 15) Il frenulo linguale corto:
- a) non influenza l'allattamento
 - b) è favorevole all'allattamento
 - c) **può causare difficoltà all'allattamento**
 - d) non può essere sottoposto a frenulectomia
- 16) Cosa si intende per "Leeway space"?
- a) Porzione di osso alveolare in cui sono alloggiati, in periodi diversi, radici e corone di elementi decidui e permanenti
 - b) Spazio, caratteristico della dentatura decidua, che si trova tra incisivo laterale e canino nell'arcata superiore e tra canino e primo molare deciduo nell'arcata inferiore
 - c) **Differenza tra i diametri mesio-distali dei molari decidui e quelli dei premolari di sostituzione**
 - d) Nessuna delle risposte è esatta
- 17) La scala di Frankl serve per effettuare:
- a) Una valutazione soggettiva del dolore
 - b) **Una valutazione comportamentale**
 - c) Una valutazione dell'ipersensibilità dentale
 - d) Una valutazione dell'occlusione
- 18) L' esfoliazione precoce dei denti decidui senza riassorbimento radicolare è uno dei segni della:
- a) **Odonto-ipofosfatasia**
 - b) Sindrome di Rieger
 - c) Displasia cleidocranica
 - d) Tutte le risposte precedenti sono corrette
- 19) Divisione parziale di un singolo germe dentario che ha dato origine a due formazioni dentarie speculari l'una all'altra è definita:
- a) Concrescenza
 - b) Fusione
 - c) **Geminazione**
 - d) Nessuna delle risposte precedenti è corretta
- 20) In caso di avulsione di dente deciduo, quale terapia è consigliata?
- a) Reimpianto immediato con splintaggio
 - b) Reimpianto immediato senza splintaggio
 - c) Reimpianto tardivo
 - d) **Nessun reimpianto se non controlli clinici e radiografici**

- 21) Quale tra i seguenti fattori anatomici aumenta il rischio di trauma?
- a) Cross-bite posteriore
 - b) Overjet aumentato**
 - c) Affollamento
 - d) Iperdivergenza
- 22) Quali denti sono maggiormente coinvolti nei traumi in dentatura decidua?
- a) Canini inferiori
 - b) Incisivi centrali superiori**
 - c) Incisivi centrali inferiori
 - d) Canini superiori
- 23) La sindrome del setto è caratteristica della:
- a) Carie interprossimale**
 - b) Pulpite
 - c) Carie occlusale
 - d) Trauma
- 24) Le infraocclusioni quando vanno trattate?
- a) Mai
 - b) Appena vengono diagnosticate
 - c) In relazione al grado di infraocclusione**
 - d) Solo quando il dente è completamente sommerso
- 25) L'occlusione in dentatura decidua si valuta tramite:
- a) La classe canina**
 - b) Solo con l'overjet
 - c) Solo con l'overbite
 - d) Non si valuta in dentatura decidua
- 26) Nel trattamento delle III classi scheletriche occorre intervenire:
- a) Il prima possibile**
 - b) Prima del picco di crescita puberale
 - c) Al picco di crescita puberale
 - d) Dopo il picco di crescita puberale
- 27) La prima chiave di Andrews valuta:
- a) Rapporti interarcata**
 - b) Angolazione delle corone
 - c) Curva di Spee
 - d) Presenza di rotazioni
- 28) Per dente neonatale si intende:
- a) Dente erotto già alla nascita
 - b) Dente erotto entro il primo mese di vita**
 - c) Dente erotto entro i primi 6 mesi di vita
 - d) Dente erotto entro il primo anno di vita
- 29) John Bowlby ha sviluppato la teoria:
- a) Del trauma
 - b) Dell'attaccamento**
 - c) Delle relazioni oggettuali
 - d) Del distaccamento
- 30) In un bambino di 15 kg (3-4 anni) qual'è la dose massima consigliata di mepivacaina?
- a) 3 fiale
 - b) 1 fiala
 - c) 1,8 fiale**
 - d) non va usata l'anestesia locale

- 31) In caso di trauma dento-alveolare di un incisivo centrale superiore qual è il primo step di indagine radiologica necessario?
- a) **Radiografia endorale periapicale**
 - b) Ortopantomografia delle arcate dentarie
 - c) CBCT
 - d) TAC
- 32) L'Odontoma è:
- a) un tumore maligno che predilige i bambini di sesso maschile
 - b) **un tumore benigno, spesso asintomatico**
 - c) nella variante complessa non si evidenziano elementi dentali di diversa forma e volume
 - d) si manifesta radiologicamente come un'area radiotrasparente
- 33) Nei bambini con cardiopatie congenite, la profilassi antibiotica di prima scelta, precedente alle cure odontoiatriche, ove dovuta, deve essere eseguita con:
- a) **Amoxicillina**
 - b) Ampicillina
 - c) Azitromicina
 - d) Clindamicina
- 34) Il "dens in dente":
- a) **E' un'anomalia di sviluppo dentale ad eziologia sconosciuta**
 - b) È l'intrusione di una cavità rivestita da dentina nella corona o nella radice
 - c) Riguarda esclusivamente gli incisivi centrali e laterali permanenti
 - d) Presenta una maggiore resistenza alla carie
- 35) La microdonzia è:
- a) la presenza di denti di dimensioni più grandi del normale
 - b) la presenza di denti fusi
 - c) la presenza di denti con corona e camera pulpare ampia
 - d) **la presenza di denti di dimensioni più piccole del normale**
- 36) Quale fra questi fattori non favorisce lo sviluppo di Early Childhood Caries:
- a) alto apporto di zuccheri
 - b) **dieta non cariogena e apporto di fluoro**
 - c) scarsa igiene orale
 - d) allattamento notturno protratto
- 37) Una radiografia panoramica prima di un trattamento ortodontico è:
- a) **Sempre necessaria**
 - b) Solo nelle III classi scheletriche
 - c) Solo nelle II classi da retrusione mandibolare
 - d) Solo nei casi di dentatura decidua
- 38) Il cross-bite monolaterale può determinare:
- a) **Crescita asimmetrica della mandibola**
 - b) Il classe scheletrica
 - c) Discrepanza verticale
 - d) Deep bite
- 39) Da che età è possibile diagnosticare una malocclusione?
- a) **5 anni**
 - b) 2 anni
 - c) 8 anni
 - d) 12 anni
- 40) Quali sono le due radiografie necessarie per la diagnosi ortodontica?
- a) Ortopantomografia + TC Cone Beam
 - b) Teleradiografia del cranio + TC Cone Beam
 - c) **Ortopantomografia + Teleradiografia del cranio**
 - d) Ortopantomografia + Risonanza magnetica

- 41) Cosa si intende per ipoplasia di Turner?
- a) Difetti dello smalto dei denti permanenti dovuti ad un processo flogistico periapicale dei corrispondenti denti decidui e i denti più colpiti risultano essere gli incisivi permanenti
 - b) **Difetti dello smalto dei denti permanenti dovuti ad un processo flogistico periapicale dei corrispondenti denti decidui e i denti più colpiti risultano essere i premolari permanenti**
 - c) Opacità dello smalto diffuse in tutta la dentatura decidua, ad eziologia sconosciuta
 - d) Opacità dello smalto diffuse in tutta la dentatura permanente, ad eziologia sconosciuta
- 42) Qual è la posologia consigliata per la somministrazione di amoxicillina in un paziente pediatrico sotto i 40 kg di peso?
- a) La medesima posologia dell'adulto
 - b) 30mg/kg per 3 somministrazioni al giorno
 - c) **50mg/kg/die divisa in 3 dosi**
 - d) 10mg/kg/die in 2 dosi giornaliere
- 43) Lo spessore smalto-dentina nei denti decidui rispetto ai denti permanenti è:
- a) Uguale
 - b) Maggiore
 - c) **Minore**
 - d) Non si trovano valori significativi in letteratura
- 44) Un dente affetto da ipomineralizzazione dello smalto dei molari e degli incisivi ha:
- a) Maggior concentrazione di Ca^{2+} e P
 - b) **Maggior concentrazione C, CO_3^{2-} e proteine**
 - c) Cristalli di idrossiapatite più compattati
 - d) Modulo di elasticità aumentato
- 45) L'esfoliazione precoce degli elementi decidui è associata a:
- a) **Ipofosfatasia**
 - b) Sindrome di Klinefelter
 - c) Sindrome di Down
 - d) Sindrome di Marfan
- 46) Quali di queste forme di malocclusioni è la più frequente?
- a) II Classe I divisione
 - b) II classe II divisione
 - c) III classe
 - d) **Affollamento**
- 47) Quale è il trauma più comune nei denti permanenti?
- a) Avulsione
 - b) **Frattura della corona**
 - c) Intrusione
 - d) Frattura della radice
- 48) Quale sigillante è meno sensibile all'umidità?
- a) **Sigillante vetroionomerico**
 - b) Sigillante in composito
 - c) Sigillante macroriempito
 - d) tutte le risposte sono corrette
- 49) Quali sono i vantaggi dell'uso della diga di gomma:
- a) **Protezione del paziente dall'ingestione o inalazione di strumenti o materiali**
 - b) Aumento dei tempi di lavoro
 - c) Aumento dello stress dell'operatore
 - d) Aumento del rischio di traumi al paziente
- 50) La tecnica del Tell Show Do è stata introdotta da:
- a) Wright
 - b) Gesell
 - c) **Addelston**
 - d) Le Vitas

- 51) Il trattamento della lingua a carta geografica è:
- a) Antimicotico topico
 - b) Terapia antibiotica
 - c) Steroidi sistemici
 - d) **Nessun trattamento**
- 52) Quale delle seguenti patologia può essere una causa di macroglossia?
- a) Sindrome di Down
 - b) Amiloidosi
 - c) Ipotiroidismo
 - d) **Tutte le cause precedenti**
- 53) Il numero totale di denti aumenta in caso di:
- a) **Geminazione**
 - b) Fusione
 - c) Concrescenza
 - d) Dens in dente
- 54) Il volume maggiore di saliva viene secreto da:
- a) Ghiandole di Von-Ebner
 - b) Ghiandola parotidea
 - c) **Ghiandola sottomandibolare**
 - d) Ghiandola sottolinguale
- 55) La causa più comune di fistola gengivale:
- a) Ascesso apicale acuto
 - b) Ascesso parodontale acuto
 - c) Cisti periapicale
 - d) **Lesione periapicale cronica**
- 56) La fluoroprofilassi aggiuntiva è controindicata in pazienti con:
- a) **Insufficienza renale cronica**
 - b) Osteoporosi
 - c) Ipertensione
 - d) Tireotossicosi
- 57) Un dente deciduo avulso deve essere:
- a) Reimpantato il prima possibile
 - b) Conservato nel latte e poi reimpiantato.
 - c) Trattato con doxiciclina prima del reimpianto
 - d) **Non deve essere reimpiantato**
- 58) La principale causa di fallimento del reimpianto di denti permanenti è:
- a) Anchilosì
 - b) Necrosi della polpa
 - c) **Riassorbimento esterno**
 - d) Chiusura dell'apice radicolare
- 59) La lesione traumatica più frequente nei denti decidui è:
- a) **Lussazione**
 - b) Frattura coronale
 - c) Concussione
 - d) Frattura radicolare
- 60) In un caso di anchiloglossia, al momento della protrusione, la lingua acquisisce una:
- a) Forma arrotondata
 - b) Forma triangolare
 - c) **Forma a cuore**
 - d) Forma appuntita

61) Il rinforzo positivo:

- a) È uno strumento per indurre i bambini alla collaborazione
- b) È solo un rinforzo materiale
- c) È solo un rinforzo psicologico
- d) Può essere caratterizzato da comportamenti troppo permissivi

62) La dentatura decidua:

- a) Presenta elementi denominati premolari
- b) Inizia verso i 6-8 mesi con l'eruzione dei centrali inferiori
- c) È composta da 24 elementi dentari
- d) Dal punto di vista cromatico è uguale a quella dei permanenti

63) La Maschera di Delaire è un dispositivo prevalentemente utilizzato nel trattamento di:

- a) malocclusioni di classe III
- b) malocclusioni di classe II
- c) malocclusioni di classe I
- d) nessuna delle precedenti

64) La dentinogenesi imperfetta di tipo III:

- a) È associata ad osteogenesi imperfetta
- b) È una malattia autosomica dominante
- c) È caratterizzata da alterazioni di numero
- d) È una malattia X-linked

65) La zona di Weil si trova:

- a) nella polpa dentale
- b) nel legamento parodontale
- c) nel cemento radicolare
- d) nella dentina

66) L'ortopantomografia:

- a) E' una procedura diagnostica senza radiazioni
- b) E' un esame diagnostico bidimensionale
- c) E' un esame diagnostico tridimensionale
- d) E' una procedura diagnostica che utilizza i campi magnetici

67) Il parodonto è costituito:

- a) gengiva, cemento radicolare, osso alveolare, legamento paradontale
- b) osso alveolare e cemento radicolare
- c) gengiva marginale e gengiva aderente
- d) legamento parodontale e osso alveolare

68) La dentina:

- a) Ricopre la corona del dente
- b) Si trova solo nella radice
- c) Si trova solo nella porzione radicolare del dente
- d) Ricopre la polpa dentaria

69) L'igiene orale nei bambini va praticato a partire dalla:

- a) Comparsa del primo dente in arcata
- b) Eruzione completa di tutti i denti decidui
- c) Eruzione degli incisivi permanenti
- d) Eruzione completa di tutti i denti permanenti

70) L'ortopantomografia delle arcate dentarie permette di identificare:

- a) Le lesioni della mucosa orale
- b) L'età del paziente
- c) Le anomalie dentarie di sviluppo, forma, posizione e numero
- d) Le lesioni della lingua